

ARACHNIDES RECUEILLIS A OBOCK EN 1886 PAR M. LE D^r L. FAUROT,

Par Eugène SIMON.

1. PLEXIPPUS PAYKULLI Aud. *in Sav.*

Obock.

Cette espèce, rapportée successivement aux genres *Hasarius* et *Menemerus*, nous paraît devoir être reportée au genre *Plexippus* C. Koch.

Elle est répandue dans toutes les régions chaudes du globe.

2. SPARASSUS WALCKENAERIUS Aud. *in Sav.*

Cf. E. Sim., *Rév. Sparass.*, 1880, p. 72.

Obock.

Répandu en Égypte, en Arabie (E. Simon), en Abyssinie, dans le pays des Comalis (Revoil), en Syrie, en Asie mineure, en Mésopotamie, dans le sud de la Tunisie et de l'Algérie.

3. THANATUS RUBICUNDULUS L. Koch, *Ægypt. u. Abyss. Arach. etc.*,
1875, p. 61, pl. vi, fig. 3.

Obock.

Décrit de l'Hamacen (Éthiopie centrale) par L. Koch, indiqué du Choa par Pavesi.

4. ARGIOPE LORDI Cambr., *P. Z. S. L.*, 1870, p. 820, pl. L, fig. 1.

Obock.

Espèce très répandue en Afrique et en Arabie : en Égypte, en Nubie, en Abyssinie, dans les Agaos, à Aden, dans la région saharienne de la Tunisie et de l'Algérie (1) et au Sénégal (2).

(1) E. Simon, *Étude sur les Arachnides recueillis en Tunisie*, etc., 1885, p. 21.

(2) E. Simon, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1885, p. 367.

5. ARTEMA MAURITIA Walck.

Pour la synonymie et la distribution géographique de cette espèce cf. E. Simon, *Bull. Soc. zool. Fr.*, X, 1885, p. 19.

Obock.

Indiqué de Souakim et de Massoua.

6. PHOLCUS FAUROTII sp. nov.

♀ long., 3^{mm}5. — Cephalothorax pallide luridus, lævis, parcissime nigro-setosus, evidenter latior quam longior, utrinque ample rotundus, postice late truncatus, parte thoracica leviter convexa et longitudinaliter anguste sulcata, parte cephalica parva leviter prominenti. Oculi laterales sat magni, utrinque tres arcte juncti; antici subrotundi reliquis vix minores, postici duo ovati et æqui, spatio inter posticos diametro oculi vix duplo latiore. Oculi quatuor antici in apicibus lineam rectam formantes, medii minuti nigri a lateralibus spatio diametro lateralium angustiore sejuncti. Clypeus verticalis planus area oculorum plus duplo latior. Chelæ debiles clypeo breviores. Abdomen globosum, valde convexum, albo-testaceum tenuiter et parce pilosum. Sternum, partes oris, pedes-maxillares pedesque omnino pallide lurida subpellucentia. Pedes-maxillares tenues et breves, tibia patella fere duplo longiore et tenuiore, tarso tibia paulo breviora graciliora ad apicem setis spiniformibus uncatis 3-4 instructo. Vulvæ plaga magna transversa, postice recte secta, supra tuberculo rufulo minuto et postice fovea vel rima transversa angusta munita.

♂ 4^{mm}. — Chelæ paululum depressæ, dentibus duobus instructæ primo parvo subbasilari, altero, in parte secunda prope marginem anteriorem sito, majore obtuso et obliquo. Pedes-maxillares maximi, albo-testacei; trochantere parvo, apophysi longa acuta et ensiformi subtus perpendiculariter armato; femore subparallelo leviter curvato; patella brevi; tibia femore et patella simul sumptis haud breviora, ad basin valde inflata, versus apicem sensim attenuata; tarso parvo truncato, apophysi exteriora fusca angusta articulo plus quadruplo longiora, in parte basali fere perpendiculari et leviter curvata, in parte apicali valde inæqualiter bifida, ramulo inferiore brevi apice membranaceo truncato et tenuissime lacinoso, ramulo superiore antice inflexo longiora paululum lanceolato et leviter contorto; bulbo maximo globoso, in parte basilari apophysi valde complicata aculeis styliformibus plurimis munita, instructo.

Obock.

Cette espèce est répandue en Égypte; nous la possédons de Ramlé et du Mex près Alexandrie (Letourneux) du Kafr-el-Douâr (W. Innes).

7. BUTHUS LIOSOMA Hempr. et Ehr.

Pour la synonymie, cf. E. Simon, *Ar. de l'Yémen*, 1882, p. 241. Obock.

Répandu en Arabie et sur la côte orientale d'Afrique. Indiqué d'Anseba par Pavesi.

8. PHRYNISCUS DEFLERSI sp. nov.

Ceph.th. : long., 16^{mm}5; lat., 10^{mm}. — Pedes-maxillares : femore, long., 38^{mm}5; tibia, long., 38^{mm}.

Cephalothorax fusco-nigricans, segmenta abdominalia supra fulvo-olivacea postice transversim anguste fusco-marginata, pedes-maxillares chelæque intense nigri, pedes fulvo-luridi femoribus late olivaceo triannulatis. — Cephalothorax transversim reniformis, saltem 1/3 latior quam longior, valde impressus, parce et sat minute granulatus, margine parcissime et minute dentato. Oculi normales. Chelæ supra, præsertim prope basin, inordinate et grosse granulosa. Pedes-maxillares longissimi; coxa parce granulosa intus serie spinarum gracilium munita; trochantere subtus dente unico valido acuto et leviter curvato, ad marginem apicalem intus dentibus 3-4 iniquis, supra inordinate et sat minute dentato; femore teretiusculo, intus leviter anguloso, minute et parum dense granuloso, intus in parte basali ad marginem superiorem dentibus parvis acutis trinis ultimo reliquis paulo remotiore, ad marginem inferiorem dentibus similibus binis longius remotis instructo; tibia teretiuscula, similiter granulosa prope apicem supra dentibus tribus, 1^o sat minuto acuto et fere perpendiculari, reliquis binis subæquis plus triplo longioribus ad basin contiguus dein sensim divaricatis et leviter curvatis, subtus dentibus binis minoribus, 1^o acuto recto subperpendiculari, altero robustiore compresso et antice valde curvato; tarso subparallelo leviter depresso, ad marginem superiorem dentibus binis 1^o robusto perpendiculari, altero submedio antice oblique directo longo gracili et leviter curvato. Pedes normales parum dense granulosi.

A *P. bacillifero* Gerst. differt femore appendicibus bacilliformi-

bus carente, a *P. lunato* Pallas (sive *P. ceylonico* C. Koch) differt tibia ad apicem supra tridentata (in *lunato* et *bacillifero* bidentata) a *P. scabro* Gerv., differt tegumentis subtilius et parcius granulosis, dentibus femoralibus minoribus et præsertim tarso ad marginem superiorem bidentato ut in genere *Damon*.

Un individu trouvé à Obock par M. le D^r Faurot, et un autre à Aden par M. Deflers.

NOTA. — Les espèces africaines de la famille des *Tarentulidæ* actuellement décrites sont :

1. *Phryniscus scaber* Gerv., Apt. III, 1844, p. 3.—Mauritius, Seychelles, Africa orientalis (1).

2. *Phryniscus bacillifer* Gerst., in Decken's Reisen in Ost Africa, III, 1873, p. 472, n° 43. — Africa orientalis et centralis.

3. *Phryniscus Deflersi* E. Sim. — Obock, Aden.

4. *Damon medius* Herbst, Nat. Ungef. Ins., 1797, p. 77, pl. iv, fig. 4.

Phrynus bassamensis Lucas, Arch. entom. Thomson, II, 1858, p. 436.

Phrynus tibialis E. Sim., Bull. Soc. zool. Fr., 1876, p. 42.

Africa occidentalis.

5. *Damon annulatipes* Wood, Trans. Am. Phil. Soc., XIII, 1869, p. 444. pl. XXIV, f. 2 (*Phrynus*).

Phrynus diadema E. Sim., loc. cit., p. 43.

Africa orientalis et meridionalis.

(1) Probablement le *Phrynus lunatus* du catalogue Butler.